

小児用肺炎球菌ワクチンの説明書

【PCV15】

不活化ワクチン・皮下注射または筋肉内注射

【PCV20】

不活化ワクチン・皮下注射または筋肉内注射

肺炎球菌感染症とは	肺炎球菌は、子どもの多くが鼻の奥に保菌していて、ときに細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を引き起こします。肺炎球菌による細菌性髄膜炎は、ヒブ（インフルエンザ菌b型）による髄膜炎より発症頻度は低いですが、重症化します。
接種対象年齢 接種回数・間隔 ⑤接種開始年齢により接種回数が異なります。	◆生後2か月以上7か月未満で開始（※標準的な接種開始期間） （初回接種）生後12か月未満の間に27日以上の間隔をおいて3回。 ただし、2回目および3回目が2歳を超えた場合は接種しない。 2回目が1歳を超えた場合は、3回目の接種は行わない。 （追加接種）初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ生後12か月以上に、1回。 ◆生後7か月以上12か月未満で開始 （初回接種）生後12か月未満の間に27日以上の間隔をおいて2回。 ただし、2回目が2歳を超えた場合は、接種しない。 （追加接種）初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ生後12か月以上に1回。 ◆1歳以上2歳未満で開始 60日以上の間隔をおいて2回 ◆2歳以上5歳未満で開始 1回
ワクチンの副反応	○ 注射部位の症状（赤み、硬結、腫れ、痛みなど）、発熱（37.5℃以上）などがみられます。 ○ 極めてまれに、ショック、アナフィラキシー、けいれん、血小板減少性紫斑病等が報告されています。 予防接種を受けたあと、副反応がおこった場合は医師の診察・治療を必ず受けてください。その後、東大阪市保健所までご連絡ください。
受けることができない人	○ 明らかに発熱している人（通常は37.5℃を超える場合） ○ 重い急性疾患にかかっている人 ○ このワクチンの成分によってアナフィラキシー（通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応）をおこしたことがある人 ○ その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがよいといわれた人
予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人	○ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある人 ○ 過去に予防接種を受けたとき、接種後2日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた人 ○ 過去にけいれん（ひきつけ）をおこしたことがある人 ○ 過去に免疫状態の異常を指摘されたことがある人、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる人 ○ このワクチンに含まれる成分にアレルギーをおこすおそれのある人
ワクチン接種後の注意	○ 接種後30分間は、ショックやアナフィラキシーがおこることがありますので、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。 ○ 接種後に高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。 ○ 接種当日は過度な運動を控え、1週間は体調に注意しましょう。 ○ 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、接種部位を強くこすることはやめましょう。 ○ 接種後、腫れが目立つときや機嫌が悪くなったときなどは医師にご相談ください。 ○ このワクチンと他のワクチンの同時接種を希望する場合は、医師にご相談ください。